

Flexitol Heel Balm

Clinically proven treatment for dry and cracked feet associated with diabetic anhydrosis

دارای
تأییدیه های
بالینی



Did you know?

- 1 in 20 people has diabetes
- 20 to %25 of diabetics consult a doctor at least once in their lifetime for a foot lesion
- Diabetes increases 15-fold the risk of lower limb amputation (toe, foot or leg)
- 10 % of diabetics require amputation
- Gangrene of the extremities is 40 times more frequent in diabetics
- More than 50% of amputations could be avoided

مواظب پاهای خود باشید



هیل بalm فلکسیتول®

• فرمولاسیون هدمند و مناسب برای پای خشک، زبر و پاشنه های ترک خورده

• مناسب برای پاهای دیابتی و حفظ سلامت عمومی پا

• حاوی درصد بالای اوره (۲۵٪) بعلاوه ترکیب سینرژستی از مرطوب کننده ها از جمله لانونین، آلوئه ورا و ...

• تنها بalm پاشنه با حداکثر کارایی با یک یا دوبار مصرف در روز

• دارای تأییدیه انجمن متخصصین پا آمریکا (APMA) و سایر تأییدیه های معتبر بین المللی از جمله MHRA و نشان CE

• بازیابی سریع رطوبت با نتایج قابل مشاهده پس از فقط ۳ روز مصرف


APPROVED



AMERICAN
PODIATRIC
MEDICAL
ASSOCIATION

Flexitol™ Heel Balm


Flexitol Heel Balm Efficacy



In a controlled 14 day trial, 27 subjects suffering dry, cracked heels applied Flexitol Diabetic Foot Balm with 25% Urea twice daily.

Results indicate that regular use of Flexitol Heel Balm increases the mean hydration levels in the heel skin and thus helps keep feet healthy and well moisturized.¹

Efficacy of Flexitol Heel Balm on Skin Hydration Levels



In a double blind comparative study, 26 outpatients with evidence of bilateral Diabetic Anhydrosis applied a 10% Urea cream to the left foot and a 25% Urea cream to the right foot twice daily.

Results indicate that the 25% Urea cream increased skin hydration levels significantly more than the 10% Urea cream.²

1. Study conducted by the Australian Photobiology Testing Facility (APTF) at the University of Sydney, Australia in 2007

2. Baird S.A., Skinner C.M., Trail S., Frankis J.S., 2002, 'A study to compare the efficacy of the use of 10% Urea cream and 25% Urea cream on the control of Anhydrosis in the diabetic foot', Glasgow Caledonian University, Glasgow.

طرز مصرف:

- پس از شستشو یا حمام مقدار کمی از بalm روی پوست مالیده شود.
- در موارد شدید بهتر است بalm قبل از خواب مصرف و سپس پا با پلاستیک یا جوراب پوشانده شود.
- پس از مصرف از صندل یا دمپایی استفاده کنید تا فرش لکه دار نشود.
- با یک یا دو بار مصرف در روز نتیجه مطلوب مشاهده خواهد شد.
- این محصول برای افراد بالای ۱۲ سال توصیه می شود.