



NCYPE

The National Centre
for Young People
with Epilepsy

چگونه Epistatus (میدازولام بوکال) را به کودکان تجویز کنیم؟



سن بیمار	دز	نحوه مصرف
دوره نئوناتال	300 micrograms/kg	فقط یک مرتبه
۱-۶ ماه	300 micrograms/kg (max 2.5mg)	فقط یک مرتبه (در صورت لزوم پس از ۱۰ دقیقه تنها یکبار امکان تکرار دارد)
۶-۱۲ ماه	2.5mg (0.25ml)	فقط یک مرتبه (در صورت لزوم پس از ۱۰ دقیقه تنها یکبار امکان تکرار دارد)
۱-۵ سال	5mg(0.5ml)	فقط یک مرتبه (در صورت لزوم پس از ۱۰ دقیقه تنها یکبار امکان تکرار دارد)
۵-۱۰ سال	7.5mg (0.75ml)	فقط یک مرتبه (در صورت لزوم پس از ۱۰ دقیقه تنها یکبار امکان تکرار دارد)
۱۰-۱۸ سال	10mg (1.0ml)	فقط یک مرتبه (در صورت لزوم پس از ۱۰ دقیقه تنها یکبار امکان تکرار دارد)

نمایندگی انحصاری



شرکت دارویی بهین پاد

info@behinpaad.com

تلفن: ۰۲۱- ۲۲۹۰ ۲۸۸۸

تشنج فوکال Focal Seizures

علائم عمومی تشنج فوکال عبارتند از:

- نگاه خیره
- جویدن
- لکنت زبان
- سرگردانی
- حرکات تکراری

در صورتیکه شما یکی از علائم فوق را در
کودکی مشاهده کردید:

- آرامش خود را حفظ کنید.
- به آرامی با کودک صحبت کنید.
- اشیاء خطرناک را از کودک دور نگه داشته و در ضمن
حرکات او را محدود نکنید.
- بیمار را از حمایت خود مطمئن کنید.
- به سایر افراد وقوع تشنج را توضیح دهید.
- کودکانی که به این نوع تشنج مبتلا می باشند، باید
تا زمان دستیابی به هوشیاری کامل تحت حفاظت
قرار گرفته و تنها رها نشوند. در مورد اطلاع بیمار از
تاریخ، محلی که قرار دارد و اینکه به کجا می خواهد
برود، اطمینان حاصل کنید.
- امکان دارد حالت گیجی بیشتر از تشنج طول بکشد و
ممکن است خطرناک باشد. در صورتیکه بیمار به
هوشیاری کامل نرسد، به اورژانس اطلاع دهید.

Helpline: 01342831342 (National Call Rate)

Mon – Fri, 9am – 1pm

Email: enquiry@ncype.org.uk

www.ncype.org.uk

Epistatus معمولاً پس از چند دقیقه از شروع تشنج، در درمان تشنج های مکرر و یا بر طبق دستور پزشک معالج تجویز می شود.

کمکهای اولیه در مواجهه با تشنج

- آرامش خود را حفظ کنید.
- به زمان وقوع تشنج دقت کنید.
- در کنار کودک بمانید.
- اشیاء خطرناک مانند میز، صندلی و ... را از اطراف بیمار دور کنید تا امکان صدمه به بیمار به حداقل برسد.
- در صورت امکان، بالش یا یک جسم نرم را در زیر سر بیمار قرار دهید.
- حین تشنج و پس از آن از کودک مراقبت کنید.
- سعی نکنید با گرفتن بیمار، حرکات او را در حین تشنج متوقف کنید.
- هیچ شئی را در دهان بیمار قرار ندهید.
- تا هنگام رفع تشنج در کنار کودک باقی بمانید و سعی کنید کودک را در موقعیت زیر قرار دهید تا به بهبودی وی کمک کنید.
- به زمان رفع تشنج دقت کنید.



معمولاً نیازی به کمک گرفتن از آمبولانس نیست، مگر آنکه:

- تشنج بیش از حد عادی (در فرد مورد نظر) ادامه پیدا کند.
- تشنج به درمان پاسخ ندهد.
- کودک دچار تشنجهای مکرر شود.
- کودک زخمی شود.
- تشنج بیشتر از ۵ دقیقه طول بکشد.

لطفاً به برنامه کنترل صرع فرزند خود مراجعه کنید

دارو را با فشار آوردن به پیستون به آرامی تجویز کنید. در صورت امکان، نیمی از دوز تجویز شده را در حفره دهانی سمت راست و نیم دیگر را در حفره دهانی سمت چپ وارد کنید. سپس سرنگ را از دهان بیمار خارج کرده و به آرامی برای چند لحظه لبهای کودک را بسته نگه دارید تا دارو در محل جذب باقی بماند.



در مورد کودکانی که در صندلی چرخدار قرار دارند، سر کودک را با دست کنترل کرده و طبق روش بالا نیمی از دوز را در حفره دهانی سمت راست و نیم دیگر را در حفره دهانی سمت چپ وارد کنید.



پس از مصرف دارو، درپوش شیشه را سریعاً در جای خود قرار دهید.



شیشه محتوی دارو را با فشار دادن درپوش در خلاف جهت عقربه های ساعت، باز کنید. سپس سرنگ را با فشار آوردن به پیستون انتهایی، به دریچه موجود وارد کنید.



شیشه دارو را بر عکس گرفته و به آرامی پیستون را بیرون بکشید تا دوز مورد نظر به سرنگ داخل شود. در صورت وجود حبابهای هوا، پیستون را فشار داده و مجدداً سرنگ را با دوز مورد نظر پر کنید.



لب های کودک را به آرامی باز کنید و نوک سرنگ را به حفره دهانی (بین لب و لثه فک پایین) وارد کنید. سرنگ را بین دندانهای بیمار قرار ندهید، زیرا ممکن است جویده شود.

