

Fexigra[®]

Fexofenadine Hydrochloride
120 & 180 mg Tablets

نسل جدید
آنتی هیستامین ها
(آنتاگونیست گیرنده H₁)



● اثر سریع در رفع علایمی مانند عطسه، آبریزش بینی،

خارش چشم، بینی و گلو، کهیر مزمن و آلرژی های پوستی

● دوام اثر طولانی تر نسبت به سایر آنتی هیستامین ها

از جمله Loratadine و Cetirizine

● عدم ایجاد خواب آلودگی

● فاقد عوارض قلبی

● عدم نیاز به تعدیل دوز در بیماران مبتلا به نارسایی کبد



Fexigra®

Fexofenadine Hydrochloride
120 & 180 mg Tablets

مکانیسم اثر:


- Fexigra آنتی هیستامین نسل دوم گیرنده های H1 می باشد و خاصیت خواب آلودگی، آنتی کولینرژیک، آنتی آدرنرژیک و آنتی دوپامینرژیک ندارد.
- بر خلاف سایر آنتی هیستامین ها Tolerance ایجاد نمی کند.
- بر ECG قلبی تاثیر ندارد (QT interval و تبادلات کانالهای K.Na و Ca را تغییر نمی دهد)

Fexigra®

Fexofenadine Hydrochloride
120 & 180 mg Tablets


برتری Fexigra نسبت به Cetirizine:

- ۱- عدم متابولیسم کبدی
- ۲- فاقد عوارض قلبی
- ۳- عدم ایجاد اختلال تمرکز و خواب آلودگی (خواب آلودگی و خستگی در درمان با Cetirizine مشاهده می شود در حالیکه این علائم در تجویز Fexigra مشاهده نمی شود)




- ۴- ماندگاری موثر و طولانی تر (از هفته دوم اثر لوراتادین مانند placebo می شود در حالی که Fexigra همچنان موثر است)

Efficacy of loratadine (but not fexofenadine) waned over week 2 as measured by 24-hour reflective TSS



Efficacy of loratadine (but not fexofenadine) waned over week 2 as measured by instantaneous TSS



References

- 1- long et al. j Allergy clin immunol 1985;76:113-117
- 2- bantz et al. Ann Allergy 1987;59:341-346
- 3- Simons et al. j allergy clin immunol 1988;82:1068-1075
- 4- Bousquet et al. j allergy clin immunol 1990;86:248-253
- 5- TSS: Total Symptom Score (Sneezing / Rhinorrhoea / Itchy nose, palate, and /or throat / Itchy, watery, red eyes / Nasal congestion)

کهیر مزمن و آلرژی پوستی

رینیت آلرژیک فصلی

موارد مصرف

۱۸۰ میلی گرم یکبار در روز

۱۲۰ میلی گرم یکبار در روز

بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال

Fexigra® در کودکان بالای ۶ ماه قابل استفاده می باشد

Fexigra® حتی در دز بالای ۸۰۰ میلی گرم در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک

فصلی بی عارضه می باشد.

Fexigra®

Fexofenadine Hydrochloride

فارماکوکینتیک:

- ۱- جذب دارو سریع می باشد.
- ۲- از سد خونی مغزی عبور نمی کند.
- ۳- نیمه عمر Fexigra ۱۴/۵ ساعت است.
- ۴- فقط ۵٪ دارو متابولیزه می شود، که بیشترین قسمت آن در موکوس روده بوده و تنها ۱/۵-۰/۵ آن توسط کبد انجام می شود.
- ۵- به دلیل متابولیسم غیر کبدی دارو، در صورت مصرف همزمان با داروهای دارای متابولیسم کبدی مشکلی ایجاد نمی کند.
- ۶- راه اصلی دفع دارو مدفوع می باشد و به مقدار کمی از ادرار دفع می گردد.

نکات قابل توصیه به بیمار:

- ۱- دارو را با معده خالی، ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا مصرف نمایید.
- ۲- دارو را همراه آب مصرف کرده و از مصرف همزمان آب میوه با آن خودداری نمایید.
- ۳- از مصرف آنتی اسید همراه دارو خودداری کنید و حداقل بین آنها ۱۵ دقیقه فاصله بگذارید.

Rx

*Tab Fexigra 120mg
ghs n=20*

